

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES
PRODUCTIONS VEGETALES

Campagne Agricole 2017 - 2018



Situation de la campagne agricole

au 20 juin 2017

Introduction

La situation de la campagne agricole du 11 au 19 juin a connu une évolution après la 1^{ère} décade de Juin. Elle est marquée par une amélioration du régime de la mousson sur l'ensemble du territoire.

Toutefois, on note une mauvaise répartition des pluies dans certaines zones des régions au cours de cette période.

Ce rapport synthèse fait la situation de l'évolution de la campagne à travers trois points.

1. Pluviométrie

La période du 11 au 19 juin 2017 a été caractérisée par des manifestations pluvio-orageuses qui ont intéressé la majeure partie du pays et ont permis d'enregistrer des hauteurs d'eau variables selon les régions.

Les hauteurs d'eau les plus élevées ont été enregistrées à Diabo (**180,8 mm** en 4 jours), à Fada (**118,3 mm** en 5 jours) , à Pama (**116,1 mm** en 3 jours) dans la région de l'Est, à Mané (**135 mm** en 3 jours) au Centre-Nord, à Tiéfora (**123,5 mm** en 3 jours) dans les Cascades, à Doulogou (**83 mm** en 2 jours) au Centre-Sud, à Dédougou (**69 mm** en 3 jours) dans la Boucle du Mouhoun.

Certaines localités comme **Tikaré et Barsalogho** dans le Centre-Nord, **Loumana** dans les Cascades n'ont pas enregistrés de pluie.

2. Physionomie de la campagne

2.1. Opérations culturelles

Les principales opérations culturelles en cours sont le labour et les semis. Les taux de labour se situent entre 25 et 50%. Les semis concernent surtout le coton, l'arachide et les céréales (sorgho, mil, maïs et riz de bas-fond). Les taux de réalisation des semis sont en majorité compris entre 0 et 50% selon les cultures et les régions. Toutefois pour l'igname et le coton ce taux est de 100% dans les Cascades, le Centre-Ouest, les Hauts-Bassins et le Sud-ouest dans la figure ci-dessous.




Figure : Taux de réalisation des semis par région

2.2. Stades de développement des cultures

Le stade de développement dominant est la levée avec des taux variant entre 0 et 25% dans la plupart des régions. Toutefois, les régions, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades enregistrent des taux supérieurs à 50% pour l'igname, le riz de bas-fonds, le coton et l'arachide.

2.3. Situation phytosanitaire

La situation phytosanitaire est marquée par des infestations de chenilles légionnaires (*Spodoptera spp*) dans les régions des Cascades, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins.

En effet, la situation se présente comme suit :

- Dans la région des Cascades, des traitements ont été effectués sur une superficie de 120 ha sur 250 ha infestés. L'opération de traitement est en cours.
- Dans la région du Sud-Ouest, les infestations des chenilles légionnaires *Spodoptera frugiperda* ont été constatées sur les céréales (Sorgho, Maïs, Coton, arachide et Mil). La superficie infestée est estimée à 10 433 ha. Des traitements et des formations des agents et des producteurs sur les techniques de traitements sont en cours.
- Dans la région des Hauts-Bassins les infestations ont concerné 444,5 ha de cultures.

Des criquets (*Zonocerus variegatus*) au stade larvaire ont été observés sur plusieurs cultures

notamment sur la banane et le maïs, le tout repartis sur environ 100 ha couvrant toute la plaine de Tenasso dans le Kéné Dougou.

3. Appréciation générale de la campagne

La répartition des pluies au cours de la période du 11 au 19 juin est assez bonne. Cela a favorisé la poursuite des opérations culturales. De manière générale, la campagne agricole est jugée bonne dans les régions du centre-Sud et des Cascades et passable dans les autres régions.

Conclusion

D'une manière générale, la campagne agricole s'installe progressivement dans toutes les régions. Cependant, le développement des cultures est hétérogène d'une région à une autre et d'une province à une autre à l'intérieur de la région.

Les principales opérations culturales demeurent le labour et les semis. Le stade de développement dominant est la levée. La campagne agricole est jugée passable dans la majeure partie du territoire.

Si les mêmes tendances se maintiennent, on assistera à une installation définitive de la campagne au cours de la troisième décennie de juin. Aussi, des pluies importantes pourraient annihiler l'effet des infestations des chenilles légionnaires.